

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP-6-7-77452660

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
ROUTE DE VASLES - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 88.35.55

ABONNEMENT ANNUEL 50 F.

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
Rte de Vasles - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN N° 86 - 1er JUILLET 1977

VIGNE

MILDIU

Des sorties de taches ont eu lieu depuis le début de cette semaine. Dans le vignoble des Charentes, la situation est donc toujours très préoccupante. Par contre le vignoble du Haut-Poitou est relativement sain.

En prévision de chutes de pluies à craindre dans le courant de la semaine prochaine, le renouvellement de la protection doit impérativement être assuré avant le 5 Juillet.

N.B. : nous rappelons que le concours de détection du mildiou reste ouvert en Haut-Poitou et Nord-Poitou (voir avis n° 79/6 Mai 77).

BOTRYTIS

De fréquentes attaques s'observent sur feuilles et parfois même sur grappes. Il n'y a pas lieu d'intervenir avec un produit spécifique actuellement. Lors des traitements anti-mildiou, on préférera cependant un produit contenant une des matières actives efficaces contre le botrytis : benomyl, carbendazime, dichlofluanide, promidione, methylthiophanate, vinchlozoline.

Nous rappelons que la méthode standard de lutte contre le botrytis prévoit 4 applications réalisées aux stades suivants :

- chute des capuchons floraux, nouaison
- fermeture de la grappe
- début de la véraison
- trois semaines avant vendanges.

OIDIUM

Le temps est très favorable à cette maladie. Intervenir par poudrage (soufre) au moment de la floraison sur les vignes attaquées.

CICADELLES (Charentes)

On note fréquemment la présence de larves. Intervenir lorsqu'il y a plus de 1 cicadelle par feuille en moyenne.

ARAGNEES JAUNES (E. carpini)

On commence à observer des manifestations de ces acariens. Il est trop tôt pour intervenir; surveiller leur évolution.

POMMIERS POIRIERS

TAVELURE

Le risque des contaminations primaires est maintenant terminé. Avant de cesser toute protection, bien s'assurer que le verger est absolument indemne de taches. Dans le cas contraire, intervenir avec un produit curatif après les prochaines pluies.

OIDIUM

De graves attaques ont été observées. Il convient d'intervenir énergiquement avec des produits spécifiques en ayant soin auparavant d'éliminer le maximum de pousses infestées.

CARPOCAPSE

Le vol se poursuit. Jusqu'à présent les conditions climatiques ont été défavorables à la ponte et à l'incubation des oeufs. Cependant le dernier traitement conseillé le 22 Juin sera bientôt en limite d'efficacité : le renouvellement devra être réalisé en fin de semaine prochaine.

POMMES de TERRE

ALTERNARIA SOLANI

Cette maladie est très fréquente en culture et elle est parfois confondue avec le mildiou. Elle se manifeste par des taches brunes, généralement petites et arrondies, plus ou moins limitées par les nervures.

Les produits suivants, efficaces contre le mildiou, ont un effet limitant sur l'Alternaria : captafol, mancozèbe, manèbe, propinèbe.

TABAC

MILDIU

A partir de semis négligés et non détruits, des attaques ont eu lieu à la mi-Juin dans les Communes de Néré et Loire-sur-Nie en Charente-Maritime.

Nous rappelons que le temps est très favorable à cette maladie et que les traitements doivent être réalisés avec le plus grand soin.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire

" POITOU - CHARENTES " :

R. GUILLEMET

Imprimé à la Station le 1er Juillet 1977 - Préc. Note : Bulletin n° 85 - 21 Juin 1977

N° du papier de presse : 535 AD.